

Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : Kırbehirli - 07/04/2008 18:43

Hayırlı sabahlar arkadaşlar; 10 gün önce yeni almış olduğun 5 kovan arıdan birinde hafta sonu kontrolünde yavru çürüdüne rast
ber çyta olarak almış olduğum arının en zayıfı bu arı idi.
Kovanımı bu durumdan kurtakmak için ne tür bir müdahale yapmam gerekir. Teşekkürler

Cvp:Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : SÝVASÝ - 07/04/2008 21:56

YAVRU ÇÜRÜDÜ

Öncelikle sitenin Arı Hastalıkları- Hastalıklarla Mücadele alt başlıklı okumalısınız.

5 çyta arıya kuvvetli denmeyeceğinden bu mevsimde kundaktaki bebek veya huzur evindeki bakıma muhtaç yapılmış muamelesi görmesi gerekiyor. Bunları ihmal ettiğimizde adi yavru çürüdü -tulumsu yavru çürüdü oluşması doğaldır. Bunu Avrupa veya Amerika çevirmem için bir dizi tedbir almak gerekecek.

1- Kolonide bulunan çytalara üstten görülecek şekilde koloniye verdiğiniz numarayı yazın.

2- Arıların üzerinde toplanmadığı fazla çyталarı alın. Beş çyta olduğunu söylemişsiniz, mümkünse üç çytaya düşürün. Bu çytalardan birini vermeyin. Hastalık buphesi geçene kadar karantina uygulayın.

3- Bölme tahtası (tahta, sunta, kontrplak, köpük vb.) ve pamuklu bez ile kovanın bir yanına sıkıptırın. Üst kapak altını sıcak suyla yıkayıp beşer beşer bezle ve gazete kağıdı ile komple örtün.

4- Kovan girişini üç santime kadar düşürerek yağma ve soğuktan koruyun.

5- Mümkünse diğer kolonilerden yavru -yavru uzaklaştırsın, papırma yoluyla arıların bu kovana girmelerini, bu koloniden de başka koloniye gidişi engelleyin. İlk defa kovandan çıkan arının üçte birinin başka kovana gittiğini unutmayın.

6- Çyталарın üzerine 250 gram kek verin, bittikçe vermeye devam edin.

7- Bir ? iki hafta izleyin, çürükler sökülüp atılıyorsa, adi yavru çürüdü olma ihtimali yüksektir.

8- Bir ay geçtiğinde arı gelişmeye devam ediyor ve çyta istiyorsa ipler yolunda demektir? Fakat yavru sahasının ortasında yavrusuz, balsız, polensiz boş gözüken ama hücre tabanında koyu kahverengi- siyah bir perit halinde sert bir madde varsa korkun. Sitenin Arı Hastalıkları- Amerikan Yavru Çürüdü bölümünü okuyun, hastalığı bilen birisi ile hastalıktan emin olduktan sonra gereğini yapın?

Cvp:Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : aricahmet - 08/04/2008 03:17

Sayın sıvası arkadaşta hastalık hakkında verdiğin bilgiler güzel çerçeve daraltma işlemini düşünmemiştin iyi bir fikir. Yalnız katılmıyacağım bir konu kovandan çıkan ilk arıların 3/1 başka kovana gider dediniz Gerçi arıların iparetlemiyoruzya belki olabilir bunun bilimsel bir araştırması yapılmış mı.

Cvp:Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : SÝVASÝ - 08/04/2008 17:22

PAPIRMA

Varroanın arıya verdiği zararlar konusunda bir araştırmada geçiyordu...Tekrar okudum, düzeltiyorum...

Normalde ilk defa uçuşa çıkan arıların beşte biri çyktıyı kovayı papırır.Aynı anda kolonilerin tamamında yavru uçurulduğunu iç girdiği kovanda kötü muamele görmez.Genellikle sıra sonlarındaki kovanlara papırma yoluyla girip daha fazla olur.Havanın rüzgarlı olması papırma oranını artırır.

Varroa ile enfekte olmuş kolonilerde bu oran iki katına kadar(%36)çıkabilir. Arının mide ve bağırsak sisteminde bulunan spor ve enfeksiyonlar ve diğer zararlılar kovandan kovana taşınmaya devam eder.Varroa ile doğru mücadele yapılmadığında hastalıklar arıyı tümüyle tamamına kolayca yayılma riski vardır...

Cvp:Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : SÝVASÝ - 20/06/2008 09:21

BASÝT YAVRU ÇÜRÜDÜ

Amerikan Yavru Çürüdünde kesin çözüm koloninin imha edilmesidir. Bunun için akşam saatlerinde arıların tamamı içeride iken kapatılır, kovan içerisine benzin, tiner gibi uçucu bir madde dökülür. Kapak altına naylon örtülerek kovan içindeki tüm arıların ölmesi beklenir. Arıyıktan uzak bir yerde kovan hariç her şey yakılarak imha edilir ve toprağa gömülür.

Laboratuvar testi yapılmadan arıların hastalığının kesinlikle bu hastalık olduğuna emin olamayız. Belirtilerden şüpheleniyorsanız tedbir olarak başka bir uygulama yapabiliriz. Şırasıyla:

- 1- Ana arıyı kafese veya ruşet kovana alırsanız, hastalık ana arıdan kaynaklandığından en sağlamı imha etmektir.
- 2- O gün atılmıyıp yumurtanın 20 gün sonra açılacağı hesaplayarak iki hafta içerisinde sağlıklı bir ana arı veya ana memesi yetmeye çalışılır.
- 3- Az sayıda kapalı göz kaldığında, yalnız ana olupmadan operasyon yapılır. Varsa bu kolonide çıkmıyıp genç anayı imha ederiz.
- 4- Kovanın yerinden alınırsa mevcutuna göre, kabartılmıyıp, en az üç dalak yerleştirilmiş, üzerinde kek bulunan kovanı aldığımız yere yerleştiririz.
- 5- Keke yakın noktaya, kafes içerisinde, ana arı veya ana memesi yerleştiririz.
- 6- Eski kovandaki arıları, kovan içerisine V beklinde yerleştirdiğimiz beze silkeleyerek üst örtülerini örteriz. Aldığımız ballı- yavru polenli tüm çyaları yaktıktan sonra toprağa gömeriz.
- 7- Arıların üzerine ve silkelediğimiz beze bulanan balların arılar tarafından bal mumuna çevrilmesi için iki gün süre ile perbet verilir.
- 8- İki gün sonra dalakların kabartıldığını, hatta bal ve polen geldiğini gördüğümüzde tekrar kontrol ederiz. İçerisinde genç anı olan emin olduktan sonra kafesteki ana arıyı serbest bırakarak perbete bağlarız. Perbet içerisine Neo- Teramcyn yada vitamini tedavi dozunda katarız.
- 9- Bir ayın sonunda kapalı gözler sorunsuz açılıyorsa başarılı olduk demektir.

Cvp:Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : emin kebeli - 11/08/2008 18:27

benim arım da da var çok moralim bozuldu çokda bakıyorum ama demekki bakımla olmuyor

Cvp:Yavru Çürüdüne Müdahale

Gönderen : SÝVASÝ - 29/04/2010 16:37

DÜZELTME

8- İki gün sonra dalakların kabartıldığını, hatta bal ve polen geldiğini gördüğümüzde tekrar kontrol ederiz. İçerisinde genç anı olan emin olduktan sonra kafesteki ana arıyı serbest bırakarak perbete bağlarız. Perbet içerisine Neo- Teramcyn yada vitamini tedavi dozunda katarız.

Antibiyotikler yasaklandığından vitamini tedavi dozunda katarız. Bir litre şuruba bir çay kaşığı yeterli.